

癌腫	レジメン名	1クールの日数
尿路上皮がん	Pembrolizumab 【3週投与】	21日
尿路上皮がん	Pembrolizumab 【6週投与】	42日

【投与量・投与スケジュール】

薬品名	投与量	投与方法	投与速度	投与スケジュール	
				Day1	Day 2～
ペルツズマブ (3週投与)	200mg/body	点滴	30分	↓	—
ペルツズマブ (6週投与)	400mg/body	点滴	30分	↓	—

【支持療法】	催吐リスク
なし	最小度

癌腫	レジメン名	1クールの日数
尿路上皮がん	GC	28日

【投与量・投与スケジュール】

薬品名	投与量	投与方法	投与速度	投与スケジュール						
				Day1	Day 2	Day9～	Day8	Day9～	Day15	Day16～
ゲムシタピン	1000mg/m <sup>2</sup>	点滴	30分	↓	—	—	↓	—	↓	—
シスプラチン	70mg/m <sup>2</sup>	点滴	120分	—	↓	—	—	—	—	—

【支持療法】	催吐リスク
ホスアプレピタント パノセトロン デキサメタゾン	高度

癌腫	レジメン名	1クールの日数
尿路上皮がん	GEM + CBDCA	28日

【投与量・投与スケジュール】

薬品名	投与量	投与方法	投与速度	投与スケジュール						
				Day1	Day 2	Day9～	Day8	Day9～	Day15	Day16～
ゲムシタピン	1000mg/m <sup>2</sup>	点滴	30分	↓	—	—	↓	—	↓	—
カルボプラチン	AUC=4	点滴	90分	—	↓	—	—	—	—	—

【支持療法】	催吐リスク
ホスアプレピタント パノセトロン デキサメタゾン	高度

癌腫	レジメン名	1クールの日数
腎細胞がん	Nivolumab 【2週間隔】	14日
腎細胞がん	Nivolumab 【4週間隔】	28日

【投与量・投与スケジュール】

薬品名	投与量	投与方法	投与速度	投与スケジュール	
				Day1	Day 2～
ニボルマブ (2週間隔)	240mg/body	点滴	30分	↓	—
ニボルマブ (4週間隔)	480mg/body	点滴	30分	↓	—

【支持療法】	催吐リスク
なし	最小度

癌腫	レジメン名	1クールの日数
腎細胞がん	Nivolumab+IPI	21日

【投与量・投与スケジュール】

薬品名	投与量	投与方法	投与速度	投与スケジュール	
				Day1	Day 2 ~
ニボルマブ	240mg/body	点滴	30分	↓	—
イピリムマブ	1mg/kg	点滴	30分	↓	—

【支持療法】	催吐リスク
なし	最小度

癌腫	レジメン名	1クールの日数
腎細胞がん	Pembrolizumab+Axitinib 【3週投与】	21日
腎細胞がん	Pembrolizumab+Axitinib 【6週投与】	42日

【投与量・投与スケジュール】

薬品名	投与量	投与方法	投与速度	投与スケジュール	
				Day1	Day 2 ~
ペルツズマブ (3週投与)	200mg/body	点滴	30分	↓	—
ペルツズマブ (6週投与)	400mg/body	点滴	30分	↓	—
アキシチニブ	添付文書参照	内用	—	↓	↓

【支持療法】	催吐リスク
なし	最小度

癌腫	レジメン名	1クールの日数
前立腺がん	CBZ+PSL	21日

【投与量・投与スケジュール】

薬品名	投与量	投与方法	投与速度	投与スケジュール	
				Day1	Day 2 ~
カバジタキセル	25mg/n <sup>1</sup>	点滴	60分	↓	—
プレドニゾン	10mg/day	内用	—	↓	↓

【支持療法】	催吐リスク
デカドロン	軽度