

癌腫	レジメン名	1クールの日数
大腸がん	XELOX	21日

【投与量・投与スケジュール】

薬品名	投与量	投与方法	投与速度	投与スケジュール		
				Day1	Day 2～14	Day15～
オキサリプラチン	130mg/m <sup>2</sup>	点滴	120分	↓	—	—
カペシタビン	添付文書参照	内用	—	↓	↓	—

【支持療法】	催吐リスク
ホスアプレピタント グラニセトロン デキサメタゾン	中等度

癌腫	レジメン名	1クールの日数
大腸がん	mFOLFOX6	14日

【投与量・投与スケジュール】

薬品名	投与量	投与方法	投与速度	投与スケジュール	
				Day1	Day 2～
レボホリナート	200mg/m <sup>2</sup>	点滴	120分	↓	—
オキサリプラチン	85mg/m <sup>2</sup>	点滴	120分	↓	—
フルオロウラシル	400mg/m <sup>2</sup>	点滴	全開	↓	—
	2400mg/m <sup>2</sup>	点滴	46時間	↓	—

【支持療法】	催吐リスク
ホスアプレピタント グラニセトロン デキサメタゾン	中等度

癌腫	レジメン名	1クールの日数
大腸がん	BV+XELOX	21日

【投与量・投与スケジュール】

薬品名	投与量	投与方法	投与速度	投与スケジュール		
				Day1	Day 2～14	Day15～
アバスチン	7.5mg/Kg	点滴	30～90分	↓	—	—
エルプラット	130mg/m <sup>2</sup>	点滴	120分	↓	—	—
カペシタビン	添付文書参照	内服	—	↓	↓	—

【支持療法】	催吐リスク
ホスアプレピタント グラニセトロン デキサメタゾン	中等度

癌腫	レジメン名	1クールの日数
大腸がん	FOLFIRI	14日

【投与量・投与スケジュール】

薬品名	投与量	投与方法	投与速度	投与スケジュール	
				Day1	Day 2 ~
レボホリナート	200mg/m <sup>2</sup>	点滴	120分	↓	—
イリノテカン	150mg/m <sup>2</sup>	点滴	120分	↓	—
フルオロウラシル	400mg/m <sup>2</sup>	点滴	全開	↓	—
	2400mg/m <sup>2</sup>	点滴	46時間	↓	—

【支持療法】	催吐リスク
ホスアプレピタント グラニセトロン デキサメタゾン	中等度

癌腫	レジメン名	1クールの日数
大腸がん	Cape+BV	21日

【投与量・投与スケジュール】

薬品名	投与量	投与方法	投与速度	投与スケジュール		
				Day1	Day 2 ~14	Day15~
アバスタチン	7.5mg/Kg	点滴	30~90分	↓	—	—
カベシタピン	添付文書参照	内服		↓	↓	—

【支持療法】	催吐リスク
なし	最小度

癌腫	レジメン名	1クールの日数
大腸がん	RAM+FOLFIRI	14日

【投与量・投与スケジュール】

薬品名	投与量	投与方法	投与速度	投与スケジュール	
				Day1	Day 2 ~
ラムシルマブ	8mg/kg	点滴	60分	↓	—
レボホリナート	200mg/m <sup>2</sup>	点滴	120分	↓	—
イリノテカン	180mg/m <sup>2</sup>	点滴	120分	↓	—
フルオロウラシル	400mg/m <sup>2</sup>	点滴	全開	↓	—
	2400mg/m <sup>2</sup>	点滴	46時間	↓	—

【支持療法】	催吐リスク
ホスアプレピタント グラニセトロン デキサメタゾン	中等度

癌腫	レジメン名	1クールの日数
大腸がん	BV+XELIRI	21日

【投与量・投与スケジュール】

薬品名	投与量	投与方法	投与速度	投与スケジュール		
				Day1	Day 2～14	Day15～
アバスタチン	7.5mg/Kg	点滴	30～90分	↓	—	—
イリノテカン	200mg/m <sup>2</sup>	点滴	90分	↓	—	—
カペシタビン	添付文書参照	内服		↓	↓	—

【支持療法】	催吐リスク
ホスアプレピタント グラニセトロン デキサメタゾン	中等度

癌腫	レジメン名	1クールの日数
大腸がん	Cetuximab+mFOLFOX6	14日

【投与量・投与スケジュール】

薬品名	投与量	投与方法	投与速度	投与スケジュール		
				Day1	Day8	Day9～
セツキシマブ（初回）	400mg/m <sup>2</sup>	点滴	120分	↓		—
	250mg/m <sup>2</sup>	点滴	60分		↓	—
セツキシマブ（2回目以降）	250mg/m <sup>2</sup>	点滴	60分	↓	↓	—
レポホリナート	200mg/m <sup>2</sup>	点滴	120分	↓	—	—
オキサリプラチン	85mg/m <sup>2</sup>	点滴	120分	↓	—	—
フルオロウラシル	400mg/m <sup>2</sup>	点滴	全開	↓	—	—
	2400mg/m <sup>2</sup>	点滴	46時間	↓	—	—

【支持療法】	催吐リスク
ホスアプレピタント グラニセトロン デキサメタゾン	中等度

癌腫	レジメン名	1クールの日数
大腸がん	Panitumumab+FOLFIRI	14日

【投与量・投与スケジュール】

薬品名	投与量	投与方法	投与速度	投与スケジュール	
				Day1	Day 2～
パニツムマブ	6mg/kg	点滴	60分	↓	
レポホリナート	200mg/m <sup>2</sup>	点滴	120分	↓	—
イリノテカン	150mg/m <sup>2</sup>	点滴	120分	↓	—
フルオロウラシル	400mg/m <sup>2</sup>	点滴	全開	↓	—
	2400mg/m <sup>2</sup>	点滴	46時間	↓	—

【支持療法】	催吐リスク
ホスアプレピタント グラニセトロン デキサメタゾン	中等度